

Mesotelioma maligno peritoneale, Regione Piemonte, 1990-2004

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per periodo e genere. Tutti i livelli di conferma diagnostica.

INCIDENZA 1990-2004 (casi certi probabili possibili)						
periodo	uomini			donne		
	casi	tassi	IC 95%	casi	tassi	IC 95%
1990-1992	25	0.4	0.2-0.5	6	0.1	0-0.1
1993-1995	15	0.2	0.1-0.3	15	0.2	0.1-0.3
1996-1998	23	0.3	0.2-0.4	25	0.3	0.2-0.4
1999-2001	22	0.3	0.2-0.4	26	0.3	0.2-0.4
2002-2004	26	0.3	0.2-0.4	22	0.2	0.1-0.3
1990-2004	111	0.3	0.2-0.3	94	0.2	0.2-0.2

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per periodo e genere. Casi con diagnosi certa.

INCIDENZA 1990-2004 (casi certi)						
periodo	uomini			donne		
	casi	tassi	IC 95%	casi	tassi	IC 95%
1990-1992	20	0.3	0.2-0.4	6	0.1	0-0.1
1993-1995	13	0.2	0.1-0.3	8	0.1	0-0.2
1996-1998	20	0.3	0.1-0.4	21	0.2	0.1-0.3
1999-2001	14	0.2	0.1-0.3	17	0.2	0.1-0.3
2002-2004	17	0.2	0.1-0.3	11	0.1	0.1-0.2
1990-2004	84	0.2	0.2-0.3	63	0.1	0.1-0.2

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per area geografica e genere. Tutti i livelli di conferma diagnostica.

INCIDENZA 1990-2004 (casi certi probabili possibili)						
area	uomini			donne		
	casi	tassi	IC 95%	casi	tassi	IC 95%
Regione Piemonte	111	0.3	0.2-0.3	94	0.2	0.2-0.2
Torino (ex USSL 1)	24	0.3	0.2-0.4	16	0.2	0.1-0.3
Casale (ex USSL 76)	31	3.5	2.2-4.7	14	1.2	0.5-1.9
Lanzo (ex USSL 37)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Val di Susa (ex USSL 36)	0	0.0	0.0	3	0.3	0-0.7
Savigliano (ex USSL 61)	1	0.2	0-0.5	1	0.2	0-0.5
Grugliasco (ex USSL 24)	9	1.3	0.5-2.2	14	1.8	0.9-2.7
Ciriè (ex USSL 27)	0	0.0	0.0	4	0.5	0-1.0

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per area geografica e genere. Casi con diagnosi certa.

INCIDENZA 1990-2004 (casi certi)						
area	uomini			donne		
	casi	tassi	IC 95%	casi	tassi	IC 95%
Regione Piemonte	84	0.2	0.2-0.3	63	0.1	0.1-0.2
Torino (ex USSL 1)	16	0.2	0.1-0.3	12	0.1	0.1-0.2
Casale (ex USSL 76)	23	2.6	1.5-3.7	10	0.9	0.3-1.5
Lanzo (ex USSL 37)	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00
Val di Susa (ex USSL 36)	0	0.0	0.00	1	0.1	0-0.2
Savigliano (ex USSL 61)	1	0.2	0-0.5	1	0.2	0-0.5
Grugliasco (ex USSL 24)	6	0.9	0.2-1.6	11	1.4	0.6-2.3
Ciriè (ex USS L27)	0	0.0	0.00	2	0.2	0-0.6

Mediana di sopravvivenza (espressa in mesi) e probabilità di sopravvivenza, per periodo.

SOPRAVVIVENZA 1990-2004						
periodo	mediana	probabilità di sopravvivenza a:				
	(mesi)	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni
1990-1992	3.4	37	14.8	11.1	7.4	7.4
1993-1995	4.4	35.7	17.9	10.7	10.7	7.1
1996-1998	3.6	37	21.7	15.2	10.9	6.5
1999-2001	5	43.5	21.7	17.4	13	6.5
2002-2004	4.8	44.7	27.7	12.8	6.4	4.3

Casi osservati, mediana di sopravvivenza (espressa in mesi) e intervallo di confidenza al 95%, 1990-2004.

SOPRAVVIVENZA 1990-2004		
	uomini	donne
osservati	104	90
mediana (mesi)	4.1	5
Intervallo confidenza	2.7-5.3	4.0-7.0

Figura 7. Trend incidenza per periodo e genere, tutti i livelli di conferma diagnostica.




Figura 8. Trend sopravvivenza per periodo, tutti i livelli di conferma diagnostica.




Figura 9. Sopravvivenza per genere, tutti i livelli di conferma diagnostica.

