

## Mesotelioma maligno pleurico, Regione Piemonte, 1990-2004.

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per periodo e genere. Tutti i livelli di conferma diagnostica.

<b>INCIDENZA 1990-2004 (casi certi probabili possibili)</b>						
<b>periodo</b>	<b>uomini</b>			<b>donne</b>		
	<b>casi</b>	<b>tassi</b>	<b>IC 95%</b>	<b>casi</b>	<b>tassi</b>	<b>IC 95%</b>
1990-1992	107	1.5	1.2-1.8	74	0.9	0.7-1.1
1993-1995	190	2.6	2.2-3	104	1.2	0.9-1.4
1996-1998	277	3.6	3.1-4	143	1.3	1.1-1.6
1999-2001	296	3.7	3.3-4.1	189	1.8	1.5-2.1
2002-2004	375	4.4	4-4.9	198	1.8	1.6-2.1
1990-2004	1245	3.2	3-3.4	708	1.4	1.3-1.5

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per periodo e genere. Casi con conferma diagnostica certa.

<b>INCIDENZA 1990-2004 (casi certi)</b>						
<b>periodo</b>	<b>uomini</b>			<b>donne</b>		
	<b>casi</b>	<b>tassi</b>	<b>IC 95%</b>	<b>casi</b>	<b>tassi</b>	<b>IC 95%</b>
1990-1992	81	1.1	0.9-1.4	64	0.8	0.6-1
1993-1995	150	2.1	1.7-2.4	82	1	0.7-1.2
1996-1998	217	2.8	2.4-3.2	93	0.9	0.7-1.1
1999-2001	210	2.6	2.3-3	118	1.2	1-1.5
2002-2004	267	3.2	2.8-3.6	135	1.3	1.1-1.6
1990-2004	925	2.4	2.2-2.6	492	1.1	1-1.2

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per area geografica e genere. Tutti i livelli di conferma diagnostica.

<b>INCIDENZA 1990-2004 (casi certi probabili possibili)</b>						
<b>area</b>	<b>uomini</b>			<b>donne</b>		
	<b>casi</b>	<b>tassi</b>	<b>IC 95%</b>	<b>casi</b>	<b>tassi</b>	<b>IC 95%</b>
Regione Piemonte	1245	3.2	3.0-3.4	708	1.4	1.3-1.5
Torino (ex USSL 1)	227	2.7	2.4-3.1	155	1.3	1.1-1.5
Casale (ex USSL 76)	280	30.8	27.1-34.5	203	17.3	14.7-19.9
Lanzo (ex USSL 37)	8	3.2	1.0-5.5	4	1.6	0-3.3
Val di Susa (ex USSL 36)	23	3.1	1.8-4.4	12	1.3	0.6-2.1
Savigliano (ex USSL 61)	16	3.7	1.9-5.5	6	1.2	0.2-2.1
Grugliasco (ex USSL 24)	53	8.0	5.8-10.2	25	3.1	1.9-4.3
Ciriè (ex USSL 27)	36	5.7	3.8-7.6	21	2.6	1.5-3.8

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per area geografica e genere. Casi con diagnosi certa.

<b>INCIDENZA 1990-2004 (casi certi)</b>						
<b>area</b>	<b>uomini</b>			<b>donne</b>		
	<b>casi</b>	<b>tassi</b>	<b>IC 95%</b>	<b>casi</b>	<b>tassi</b>	<b>IC 95%</b>
Regione Piemonte	925	2.4	2.2-2.6	492	1.1	1.0-1.2
Torino (ex USSL 1)	165	2.0	1.7-2.3	109	1.0	0.8-1.2
Casale (ex USSL 76)	210	23.6	20.3-26.9	145	13.5	11.2-15.9
Lanzo (ex USSL 37)	6	2.5	0.5-4.5	3	1.3	0-2.8
Val di Susa (ex USSL 36)	18	2.5	1.3-3.7	8	1.0	0.3-1.6
Savigliano (ex USSL 61)	13	3.0	1.4-4.7	5	1.1	0.1-2.0
Grugliasco (ex USSL 24)	47	7.1	5.1-9.2	20	2.6	1.5-3.7
Ciriè (ex USSL 27)	25	3.8	2.3-5.4	16	2.0	1.0-3.0

Mediana di sopravvivenza (espressa in mesi) e probabilità di sopravvivenza, per periodo.

<b>SOPRAVVIVENZA 1990-2004</b>						
<b>periodo</b>	<b>mediana</b>	<b>probabilità di sopravvivenza a:</b>				
	<b>(mesi)</b>	<b>6 mesi</b>	<b>1 anno</b>	<b>2 anni</b>	<b>3 anni</b>	<b>5 anni</b>
1990-1992	7.3	56.9	31	12.1	6.3	1.7
1993-1995	8	65.8	36.9	17.4	8.4	4.2
1996-1998	9	60.7	39	16.3	8.3	4.6
1999-2001	9.5	64.2	41	16	8.3	2.7
2002-2004	10.5	67.9	43.2	19	9.9	4.6

Casi osservati, mediana di sopravvivenza (espressa in mesi) e intervallo di confidenza al 95%, 1990-2004.

<b>SOPRAVVIVENZA 1990-2004</b>		
	<b>uomini</b>	<b>donne</b>
osservati	1223	695
mediana (mesi)	9.1	9.6
Intervallo confidenza	8.5-10.0	8.4-10.5

Figura 4. Trend incidenza per periodo e genere, tutti i livelli di conferma diagnostica.




Figura 5. Trend sopravvivenza per periodo, tutti i livelli di conferma diagnostica.




Figura 6. Sopravvivenza per genere, tutti i livelli di conferma diagnostica.

