

Mesotelioma maligno, tutte le sedi (pleurica, peritoneale, pericardica, tunica vaginale del testicolo), Regione Piemonte, 1990-2004.

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per periodo e genere. Tutti i livelli di conferma diagnostica.

INCIDENZA 1990-2004 (casi certi probabili possibili)						
periodo	uomini			donne		
	casi	tassi	IC 95%	casi	tassi	IC 95%
1990-1992	133	1.8	1.5-2.2	80	0.9	0.7-1.1
1993-1995	208	2.9	2.5-3.3	119	1.3	1.1-1.6
1996-1998	301	3.9	3.4-4.3	168	1.6	1.3-1.9
1999-2001	319	4	3.5-4.4	216	2.1	1.8-2.4
2002-2004	405	4.8	4.3-5.3	221	2.1	1.8-2.4
1990-2004	1366	3.5	3.3-3.7	804	1.6	1.5-1.7

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per periodo e genere. Casi con conferma diagnostica certa.

INCIDENZA 1990-2004 (casi certi)						
periodo	uomini			donne		
	casi	tassi	IC 95%	casi	tassi	IC 95%
1990-1992	102	1.4	1.1-1.7	70	0.8	0.6-1
1993-1995	165	2.3	1.9-2.6	90	1.1	0.8-1.3
1996-1998	238	3.1	2.7-3.5	114	1.2	0.9-1.4
1999-2001	225	2.8	2.5-3.2	135	1.4	1.2-1.7
2002-2004	288	3.5	3.1-3.9	147	1.5	1.2-1.7
1990-2004	1018	2.7	2.5-2.8	556	1.2	1.1-1.3

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per area geografica e genere. Tutti i livelli di conferma diagnostica.

INCIDENZA 1990-2004 (casi certi probabili possibili)						
area	uomini			donne		
	casi	tassi	IC 95%	casi	tassi	IC 95%
Regione Piemonte	1366	3.5	3.3-3.7	804	1.6	1.5-1.7
Torino (ex USSL 1)	255	3.1	2.7-3.4	171	1.5	1.3-1.7
Casale (ex USSL 76)	311	34.3	30.4-38.2	217	18.5	15.8-21.2
Lanzo (ex USSL 37)	8	3.2	1.0-5.5	4	1.6	0-3.3
Val di Susa (ex USSL 36)	23	3.1	1.8-4.4	15	1.6	0.8-2.5
Savigliano (ex USSL 61)	17	3.8	2.0-5.7	7	1.4	0.3-2.4
Grugliasco (ex USSL 24)	62	9.4	7.0-11.8	39	4.9	3.3-6.4
Ciriè (ex USSL 27)	36	5.7	3.8-7.6	25	3.1	1.9-4.4

Casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (standard: popolazione italiana al censimento 1981) per 100.000 per anno, intervallo di confidenza al 95%, per area geografica e genere. Casi con diagnosi certa.

INCIDENZA 1990-2004 (casi certi)						
area	uomini			donne		
	casi	tassi	IC 95%	casi	tassi	IC 95%
Regione Piemonte	1018	2.7	2.5-2.8	556	1.2	1.1-1.3
Torino (ex USSL 1)	184	2.2	1.9-2.6	121	1.1	0.9-1.3
Casale (ex USSL 76)	233	26.2	22.7-29.6	155	14.4	12-16.8
Lanzo (ex USSL 37)	6	2.5	0.5-4.5	3	1.3	0-2.8
Val di Susa (ex USSL 36)	18	2.5	1.3-3.7	9	1.0	0.3-1.7
Savigliano (ex USSL 61)	14	3.2	1.5-4.9	6	1.3	0.2-2.3
Grugliasco (ex USSL 24)	53	8.0	5.8-10.2	31	4.0	2.6-5.4
Ciriè (ex USSL 27)	25	3.8	2.3-5.4	18	2.3	1.2-3.3

Mediana di sopravvivenza (espressa in mesi) e probabilità di sopravvivenza, per periodo.

SOPRAVVIVENZA 1990-2004						
periodo	mediana	probabilità di sopravvivenza a:				
	(mesi)	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni
1990-1992	6.7	54	28.7	11.9	6.4	2.5
1993-1995	8.5	63.1	35.3	16.7	8.5	4.4
1996-1998	8.2	58.1	37.2	16.2	8.5	4.8
1999-2001	8.9	62.5	39.6	16.3	8.7	3
2002-2004	10.2	66.2	42.3	18.9	10	4.9

Casi osservati, mediana di sopravvivenza (espressa in mesi) e intervallo di confidenza al 95%, 1990-2004.

SOPRAVVIVENZA 1990-2004		
	uomini	donne
osservati	1336	787
mediana (mesi)	8.7	8.9
Intervallo confidenza	8.2-9.5	7.9-9.9

Figura 1. Trend incidenza per periodo e genere, tutti i livelli di conferma diagnostica.




Figura 2. Trend sopravvivenza per periodo, tutti i livelli di conferma diagnostica.




Figura 3. Sopravvivenza per genere, tutti i livelli di conferma diagnostica.

