

Le raccomandazione di sorveglianza post-polipectomia

Renato Fasoli

**Consulente Screening CCR ed endoscopia operativa –
ASL Cuneo1**



Il sottoscritto Renato Fasoli

ai sensi dell'art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell'Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009,


dichiara

che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario


Linee-guida sorveglianza post-polipectomia ESGE 2000

13. FLOWCHARTS RIASSUNTIVE

SCHEMA FOLLOW-UP PRINCIPALE




SCHEMA FOLLOW-UP POLIPI ≥ 20 MM




Raccomandazione dopo colonscopia negativa

Italia 2021




Raccomandazione dopo colonscopia negativa

Italia 2021




Raccomandazione dopo Adenoma a basso rischio Italia 2021




Raccomandazione dopo Adenoma a basso rischio


Italia 2021




Intervalli di sorveglianza raccomandati in base all'esito del secondo livello - Totale Piemonte




Intervalli di sorveglianza raccomandati in base all'esito del secondo livello - Alessandria




Intervalli di sorveglianza raccomandati in base all'esito del secondo livello - Asti




Intervalli di sorveglianza raccomandati in base all'esito del secondo livello - Biella Vercelli




Intervalli di sorveglianza raccomandati in base all'esito del secondo livello - Cuneo




Intervalli di sorveglianza raccomandati in base all'esito del secondo livello - ASL TO 3




Intervalli di sorveglianza raccomandati in base all'esito del secondo livello - Ivrea




Intervalli di sorveglianza raccomandati in base all'esito del secondo livello - Moncalieri



Intervalli di sorveglianza raccomandati in base all'esito del secondo livello - Novara



Intervalli di sorveglianza raccomandati in base all'esito del secondo livello - Torino



Conclusioni

- I dati sulla qualità degli intervalli di sorveglianza sono inficiati dalle revisioni relativamente recenti delle linee-guida delle principali società scientifiche, tutte a favore di una maggior lassità nella programmazione del follow-up post-polipectomia.
- I dati regionali sulle classi di rischio basse sono complessivamente soddisfacenti (>70% di correttezza)
- Più difficile il giudizio sulle classi di rischio più alte (maggior variabilità, numerosità più basse)

- Grazie per l'attenzione

- Grazie a Carlo Senore per aver fornito i dati regionali