

MESOTELIOMA MALIGNO PERITONEALE Regione Piemonte, 1990-2018

Mesotelioma maligno peritoneale. Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (per 100.000 per anno; standard: popolazione europea EU27) e intervallo di confidenza (IC) al 95%, per sesso e periodo di calendario.

INCIDENZA 1990-2018 (diagnosi certe, probabili, possibili)						
	Uomini			Donne		
Periodo	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%
1990-1994	35	0.4	0.2-0.5	16	0.1	0.1-0.2
1995-1999	40	0.4	0.3-0.5	43	0.3	0.2-0.5
2000-2004	40	0.4	0.3-0.5	42	0.3	0.2-0.4
2005-2009	47	0.4	0.3-0.5	34	0.3	0.2-0.3
2010-2014	33	0.3	0.2-0.4	26	0.2	0.1-0.3
2015-2018	26	0.3	0.2-0.4	20	0.2	0.1-0.2

INCIDENZA 1990-2018 (diagnosi certe)						
	Uomini			Donne		
Periodo	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%
1990-1994	27	0.3	0.2-0.4	12	0.1	0.0-0.2
1995-1999	32	0.3	0.2-0.4	32	0.3	0.2-0.4
2000-2004	25	0.2	0.1-0.3	23	0.2	0.1-0.3
2005-2009	31	0.3	0.2-0.4	21	0.2	0.1-0.2
2010-2014	27	0.2	0.1-0.3	21	0.2	0.1-0.2
2015-2018	23	0.2	0.1-0.3	15	0.1	0.1-0.2

Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (per 100.000 per anno) e intervalli di confidenza (IC) al 95%, per sesso e ASL di residenza, nell'ultimo quinquennio disponibile (2014-2018).

Incidenza 2014-2018 (diagnosi certe, probabili, possibili)						
	UOMINI			DONNE		
ASL	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%
AL	9	0.7	0.2-1.2	1	0.1	0-0.2
AT	1	0.2	0-0.5	0	0	0
BI	0	0.0	0	0	0	0
CN1	2	0.2	0-0.4	2	0.1	0-0.3
CN2	0	0	0	1	0.2	0-0.7
NO	3	0.3	0-0.7	0	0	0
TO	5	0.2	0-0.4	1	0	0-0.1
TO3	3	0.2	0-0.4	12	0.6	0.2-0.9
TO4	3	0.2	0-0.5	5	0.3	0-0.7
TO5	3	0.3	0-0.7	1	0.1	0-0.3
VC	2	0.3	0-0.8	1	0.2	0-0.5
VCO	1	0.3	0-0.9	1	0.2	0-0.7

Mesotelioma maligno peritoneale. Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati e intervallo di confidenza (IC) al 95%, per sesso e area geografica.

INCIDENZA 2014-2018 tutte le diagnosi (casi certi, probabili, possibili)								
DISTRETTI	DONNE			UOMINI				
	tassi	IC 95%		n.osservati	tassi	IC 95%		n.osservati
Regione Piemonte	0.2	0.1	0.2	25	0.3	0.2	0.4	32
AL/1 (Acqui Terme)	0	0	0	0	0	0	0	0
AL/2 (Alessandria)	0	0	0	0	0.9	0	1.8	3
AL/3 (Casale Monferrato)	0	0	0	0	2.1	0.2	3.9	5
Comune Casale Monferrato	0	0	0	0	3.5	0	7.4	3
AL/4 (Novi Ligure)	0	0	0	0	0	0	0	0
AL/5 (Ovada)	0	0	0	0	1.2	0	3.5	1
AL/6 (Tortona)	0	0	0	0	0	0	0	0
AL/7 (Valenza)	1.1	0	3.2	1	0	0	0	0
AT/1 (Asti centro)	0	0	0	0	0	0	0	0
AT/2 (Asti nord)	0	0	0	0	0	0	0	0
AT/3 (Asti sud-Nizza M.to)	0	0	0	0	0.6	0	1.8	1
BI/1(Biella)	0	0	0	0	0	0	0	0
BI/2 (Cossato)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/1 (Borgo San Dalmazzo)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/2 (Ceva)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/3 (Cuneo)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/4 (Fossano)	0	0	0	0	0.4	0	1.2	1
CN1/5 (Mondovi)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/6 (Saluzzo)	0.7	0	1.8	2	0.5	0	1.4	1
CN2/1 (Alba)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN2/2 (Bra)	0.6	0	1.8	1	0	0	0	0
NO/1 (Arona)	0	0	0	0	0	0	0	0
NO/2 (Borgomanero)	0	0	0	0	1.0	0	2.5	2
NO/3 (Galliate-Trecate)	0	0	0	0	0	0	0	0
NO/4 (Novara)	0	0	0	0	0.3	0	0.8	1
TO (Torino)	0	0	0.1	1	0.2	0	0.4	5
TO3/1 (Collegno)	2.7	0.8	4.6	8	0.7	0	1.7	2
TO3/2 (Giaveno)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/3 (Orbassano)	0.3	0	0.9	1	0	0	0	0
TO3/4 (Pinerolo)	0	0	0	1	0	0	0	0
TO3/5 (Rivoli)	0.4	0	1.2	1	0	0	0	0
TO3/6 (Susa)	0	0	0	0	0.4	0	1.1	1
TO3/7 (Val Pellice)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/8 (Val Chisone e Germanasca)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/9 (Venaria)	0.3	0	0.9	1	0	0	0	0
TO4/1 (Ciriè)	0.3	0	0.9	1	0	0	0	0
TO4/2 (Chivasso)	0.4	0	1.3	1	1.2	0	2.8	2
TO4/3 (Settimo Torinese)	1.0	0	2.3	2	0	0	0	0
TO4/4 (San Mauro Torinese)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO4/5 (Ivrea)	0.2	0	0.5	1	0.3	0	0.8	1
TO4/6 (Cuorgnè)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO5/1(Carmagnola)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO5/2 (Chieri)	0	0	0	0	1.0	0	2.1	3
TO5/3 (Moncalieri)	0.4	0	1.1	1	0	0	0	0
TO5/4 (Nichelino)	0	0	0	0	0	0	0	0
VC/1(Vercelli-Santhià)	0.3	0	1.0	1	0.3	0	0.9	1
VC/2 (Montano-Borghosesia-Varallo)	0	0	0	0	0.4	0	1.2	1
VCO/1(Domodossola)	0	0	0	0	0	0	0	0
VCO/2 (Omegna)	0	0	0	0	0	0	0	0
VCO/3 (Verbania)	0.6	0	1.0	1	0.8	0	2.4	1

Mesotelioma maligno peritoneale. Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati e intervallo di confidenza (IC) al 95%, per sesso e area geografica.

INCIDENZA 2014-2018 diagnosi morfologica (casi certi)								
DISTRETTI	DONNE				UOMINI			
	tassi	IC 95%		n.osservati	tassi	IC 95%		n.osservati
Regione Piemonte	0.1	0.1	0.2	18	0.2	0.1	0.3	28
AL/1 (Acqui Terme)	0	0	0	0	0	0	0	0
AL/2 (Alessandria)	0	0	0	0	0.9	0	1.8	3
AL/3 (Casale Monferrato)	0	0	0	0	2.1	0.2	3.9	5
Comune Casale Monferrato	0	0	0	0	3.5	0	7.4	3
AL/4 (Novi Ligure)	0	0	0	0	0	0	0	0
AL/5 (Ovada)					1.2	0	3.5	1
AL/6 (Tortona)	0	0	0	0	0	0	0	0
AL/7 (Valenza)	0	0	0	0	0	0	0	0
AT/1 (Asti centro)	0	0	0	0	0	0	0	0
AT/2 (Asti nord)	0	0	0	0	0	0	0	0
AT/3 (Asti sud-Nizza M.to)	0	0	0	0	0.6	0	1.8	1
BI/1(Biella)	0	0	0	0	0	0	0	0
BI/2 (Cossato)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/1 (Borgo San Dalmazzo)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/2 (Ceva)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/3 (Cuneo)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/4 (Fossano)	0	0	0	0	0.4	0	1.2	1
CN1/5 (Mondovi)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/6 (Saluzzo)	0.4	0	1.3	1	0	0	0	0
CN2/1 (Alba)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN2/2 (Bra)	0.6	0	1.8	1	0	0	0	0
NO/1 (Arona)	0	0	0	0	0	0	0	0
NO/2 (Borgomanero)	0	0	0	0	1.0	0	2.5	2
NO/3 (Galliate-Trecate)	0	0	0	0	0	0	0	0
NO/4 (Novara)	0	0	0	0	0.3	0	0.8	1
TO1-10 (Torino)	0	0	0	0	0.2	0	0.4	5
TO3/1 (Collegno)	2.4	0.6	4.2	7	0.7	0	1.7	2
TO3/2 (Giaveno)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/3 (Orbassano)	0.3	0	0.9	1	0	0	0	0
TO3/4 (Pinerolo)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/5 (Rivoli)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/6 (Susa)	0	0	0	0	0.4	0	1.1	1
TO3/7 (Val Pellice)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/8 (Val Chisone e Germanasca)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/9 (Venaria)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO4/1 (Ciriè)	0.3	0	0.9	1	0	0	0	0
TO4/2 (Chivasso)	0.4	0	1.3	1	1.2	0	2.8	2
TO4/3 (Settimo Torinese)	1.0	0	2.3	2	0	0	0	0
TO4/4 (San Mauro Torinese)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO4/5 (Ivrea)	0.2	0	0.5	1	0.3	0	0.8	1
TO4/6 (Cuorgnè)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO5/1(Carmagnola)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO5/2 (Chieri)	0	0	0	0	0.7	0	1.6	2
TO5/3 (Moncalieri)	0.4	0	1.1	1	0	0	0	0
TO5/4 (Nichelino)	0	0	0	1	0	0	0	0
VC/1(Vercelli-Santhià)	0.3	0	1	1	0.3	0	0.9	1
VC/2 (Montano-Borghosesia-Varallo)	0	0	0	0	0	0	0	0
VCO/1(Domodossola)	0	0	0	0	0	0	0	0
VCO/2 (Omegna)	0	0	0	0	0	0	0	0
VCO/3 (Verbania)	0.6	0	1.8	1	0	0	0	0

SOPRAVVIVENZA

Mediana di sopravvivenza e probabilità di sopravvivenza per periodo di calendario

SOPRAVVIVENZA 1990-2018							
periodo	mediana	Probabilità di sopravvivenza a :					
	(mesi)	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	
1990-1994	4.7	46%	24%	10%	8%	8%	
1995-1999	4.7	36%	21%	16%	12%	5%	
2000-2004	4.7	42%	23%	14%	7%	4%	
2005-2009	6.0	51%	30%	17%	11%	8%	
2010-2014	5.0	47%	32%	17%	15%	10%	
2015-2018	2.5	33%	24%	18%	15%	15%	

Mediana di sopravvivenza e probabilità di sopravvivenza per classe d'età

SOPRAVVIVENZA 1990-2018							
classe d' età	mediana	Probabilità di sopravvivenza a :					
	(mesi)	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	
00-54	5.3	50%	37%	25%	21%	15%	
55-64	8.0	55%	34%	22%	15%	10%	
65-74	5.0	45%	27%	15%	11%	7%	
75+	2.2	25%	9%	14%	-	-	

Mediana di sopravvivenza e probabilità di sopravvivenza per istotipo

SOPRAVVIVENZA 1990-2018							
istotipo	mediana	Probabilità di sopravvivenza a :					
	(mesi)	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	
epiteliomorfo	5.2	46%	27%	16%	12%	8%	
bifasico	2.7	32%	15%	8%	-	-	
sarcomatoso	2.3	17%	8%	8%	8%	-	
non specificato	5.1	45%	27%	15%	11%	7%	
non noto	1.8	25%	9%	4%	-	-	